


Bonifiche bolognesi a sud del Reno Ambito 13



Dati Territoriali Ambito: 13


Superficie territoriale: 524.018.498 kmq



Beni art. 136	0,00%	Incidenza
		Bassa
Parchi, Riserve e rete Natura 2000	23,49%	Incidenza
		Medio Basso
Avanzamento dell'urbanizzazione in aree dedicate a Parchi, Riserve e rete Natura 2000	- 0,01%	

I dati riportati in tabella fanno riferimento all'annualità del 2017

CARTA DI IDENTITÀ : Dati Statistici



Demografia

3 COMUNI: Baricella, Malalbergo, Molinella.

POPOLAZIONE (2018)	31.832
DENSITÀ	140,1 ab/Kmq
VARIAZIONE % POPOLAZIONE (2013-2018)	0,1%
POPOLAZIONE ESTERNA AI CENTRI ABITATI	10,9%

Economia

UNITÀ LOCALI (2017)	2.829
ADDETTI (2017)	8.131

INDICE DI SPECIALIZZAZIONE

Agricoltura	Industria	Costruzioni	Commercio	Terziario
1,7 ●	1,0 ●	1,3 ●	1,0 ●	0,9 ●

 AMBITO 13

Infrastrutture principali

-  Autostrada
-  Strada Provinciale; Strada Statale
-  Infrastrutture ferroviarie
-  Reti infrastrutturali


Uso del Suolo dettaglio 2017

-  Zone urbanizzate
-  Insediamenti produttivi, commerciali
-  Aree aeroportuali ed eliporti
-  Aree Estrattive e Cantieri

-  Vigneti
-  Frutteti e frutti minori
-  Arboricoltura da legno
-  Prati stabili
-  Zone agricole eterogenee
-  Seminativi
-  Impianti fotovoltaici

-  Boschi di latifoglie
-  Boschi di conifere e misti di conifere e latifoglie
-  Cespuglieti, arbusteti e aree a vegetazione arborea-arbustiva in evoluzione
-  Zone umide interne

-  Bacini d'acqua
-  Corsi d'acqua canali e idrovie





CARATTERI E DINAMICHE DELL'USO DEL SUOLO




Uso del suolo

L'ambito è caratterizzato da un uso prettamente **agricolo**. La percentuale di urbanizzazione è **sotto la media regionale** mentre è sopra la media regione la presenza di aree d'acqua e di zone umide. Risulta ridotto la presenza di aree di seminaturali.



Rispetto ai dati del 2017, si è registrato una **diminuzione** di aree agricole e zone d'acqua in favore delle aree seminaturali, urbanizzate e aree umide.


Variazione Relativa dell'Uso del Suolo



■ Urbanizzato ■ Agricolo ■ Seminaturale ■ Umido ■ Acque

Riduzione del territorio agricolo


I territori agricoli sono in progressiva trasformazione verso le **aree urbanizzate**, le **zone umide** e **aree seminaturali**, in misura minore verso le zone d'acqua. La riduzione del territorio agricolo vede un sensibile rallentamento nel periodo 2014-2017.



■ Urbanizzato ■ Seminaturale ■ Umido ■ Acqua


L'ambito ha un indice di impermeabilizzazione **medio-basso**, **sotto la media regionale**. Il trend è in crescita nel periodo 2014-2017.

Indice di Impermeabilizzazione




BONIFICHE BOLOGNESI A SUD DEL RENO Ambito 13


MATRICE DI PAESAGGIO. L'ambito è caratterizzato da una **stabilità alta**. Nel periodo 2008-2014 vi è un aumento di stabilità sottolineata da una riduzione delle superfici seminaturali a favore di **quelle agricole**. Mentre le aree urbanizzate rimangono costanti nel tempo.



Paesaggio agricolo - Le aree agricole sono costituite in massima parte da **seminativi**. Sono presenti anche frutteti e frutti minori.



Paesaggio d'acqua - L'ambito è caratterizzato dalla presenza da corsi d'acqua, canali e idrovie. Importante è anche la presenza di bacini d'acqua.



CARATTERI E DINAMICHE
INDICATORI DI PAESAGGIO



Indice di eterogeneità e di equiripartizione

L'ambito mostra un livello **basso di diversità** del sistema paesaggistico sebbene il dato presenti un trend negativo negli ultimi anni. Questo denota una leggera diminuzione degli **elementi paesaggistici**. Dalla lettura dell'indice di equiripartizione invece emerge che l'ambito presenta un **buono stato paesaggistico**, posizionandosi nella fascia tra il 55 e 65%.

Indice di connettività

Il valore della **connettività paesaggistica** è in leggera diminuzione attestandosi ben al di sotto della media regionale. Il trend conferma una leggera **diminuzione della complessità e della connettività ecologica** tra i diversi habitat che caratterizzano l'ambito.

Biopotenzialità

Il grado di equilibrio naturale calcolato sulla biopotenzialità media si attesta su una livello **medio-basso, al di sotto della media regionale**. Questo denota una limitata **capacità rigenerative del paesaggio**.

Elementi Frammentanti

Da **urbanizzazione**: l'ambito è caratterizzato da **frammentazione medio-alta, sotto la media regionale**.

Da **infrastrutturazione**: in generale l'ambito denota **medio-alto livello di interferenza** per infrastrutturazione. In aree non urbanizzate, la **densità è invece tra bassa e molto bassa**. In entrambi i casi sotto la media regionale.

In **aree rurali**: la frammentazione è causata principalmente dagli **insediamenti industriali e commerciali** seguiti da aree dedicate a **reti e trasporto dell'energia e discariche**.

